



Procedures/Diagnostic Tests

Warren Grant Magnuson Clinical Center
National Institutes of Health

Μετά την μετάγγιση αίματός σας Οδηγίες εξωτερικού ασθενή

Μπορείτε να επανέλθετε στις συνηθισμένες δραστηριότητές σας 4 με 6 ώρες μετά την μετάγγιση αίματός σας. Οι αντιδράσεις σε μετάγγιση αίματος μπορεί να καθυστερήσουν.

- Εάν σας παρουσιαστεί πυρετός με ή χωρίς ρίγους κατά τις επόμενες 48 ώρες, ίσως να σημαίνει ότι έχετε αργοπορημένη αντίδραση στην μετάγγιση.
- Εάν παρατηρήσετε ότι τα ούρα σας έχουν σκούρο χρώμα, το δέρμα σας έχει κιτρινωπό χρώμα, ή εάν αισθάνεστε ασυνήθιστη κούραση κατά τις επόμενες 2 εβδομάδες, ίσως να σημαίνει ότι έχετε αργοπορημένη αντίδραση στην μετάγγιση.

Εάν νομίζετε ότι έχετε αργοπορημένη αντίδραση στην μετάγγιση, τηλεφωνήστε αμέσως στο υγειονομικό προσωπικό που σας κουράρει.

ΟΝΟΜΑ: _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: _____



8/1/03

This information is prepared specifically for patients participating in clinical research at the Warren Grant Magnuson Clinical Center at the National Institutes of Health and is not necessarily applicable to individuals who are patients elsewhere. If you have questions about the information presented here, talk to a member of your healthcare team.
Questions about the Clinical Center? OCCC@cc.nih.gov

Where applicable, brand names of commercial products are provided only as illustrative examples of acceptable products, and do not imply endorsement by NIH; nor does the fact that a particular brand name product is not identified imply that such product is unsatisfactory.

National Institutes of Health
Warren Grant Magnuson Clinical Center
Bethesda, Maryland 20892